

OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DOSPĚLÉ

Mimo pravidelné očkování dle zákona

| Onemocnění | Věk | | | | | | Přeočkování | Poznámka |
|---------------------------------------|--|--------------------------|----|--|--------------------------|-----|--|---|
| | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 | 65+ | | |
| Tetanus | V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ | PŘEOČKOVÁNÍ PO 15 LETECH | | | PŘEOČKOVÁNÍ PO 10 LETECH | | každých 10–15 let | možnost kombinované vakcíny i proti záškrtu a černému kašli |
| Černý kašel | V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ | PŘEOČKOVÁNÍ PO 15 LETECH | | | | | 10–15 let | kombinovaná vakcína i proti záškrtu a tetanu |
| Plané neštovice | 2 | | | | | | nebylo stanoveno | |
| Hepatitida A | 2 | | | | | | dle použité vakcíny a rizikových faktorů | |
| Hepatitida B | V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ OD ROKU 1989 | | | 3 | | | dle individuálních rizikových faktorů | |
| Klíšřová encefalitida | 3 DÁVKY, 1. PŘEOČKOVÁNÍ VŽDY PO 3 LETECH, NÁSLEDNĚ PO 5 LETECH | | | VE STARŠÍM VĚKU PŘEOČKOVÁNÍ DLE VĚKU A TYPU VAKCÍNY ZA 3–5 LET | | | dle věku a použité vakcíny | od 50 let hrazeno ze ZP |
| HPV infekce | 3 | | | | | | nebylo stanoveno | |
| Pneumokokové nákazy | 1 | | | | | | dle aktuálních doporučení | do 65 let doporučeno rizikovým skupinám |
| Meningokové nákazy typu A, C, W135, Y | 1 | | | | | | přeočkování u rizikových skupin doporučeno po 5 letech | |
| Meningokové nákazy typu B | 2 | | | | | | přeočkování u rizikových skupin doporučeno po 5 letech dle vakcíny | |
| Chřipka | 1 | | | | | | každoročně | |
| Pásový opar | 2 | | | | | | nebylo stanoveno | od 50 let, od 18 let pro rizikové pacienty |
| Vzteklina | 2/3 | | | | | | 1 dávka po 1 roce / přeočkování 1 dávkou každých 10 let | platí jen pro endemické země s výskytem onemocnění |



Doporučeno dané věkové kategorii



Hrazeno z veřejného ZP